

Stage Var - Cap Sicié le 26 avril 2016

Liste établie par Elisabeth (Botanique en Vercors)

- Convolvulus althaeoides* – Liseron fausse mauve, fausse guimauve - Convolvulaceae
Phagnalon saxatile - Phagnalon des rochers - Asteraceae
Rhamnus alaternus - Nerprun alaterne - Rhamnaceae
Phillyrea angustifolia - Filaire à feuille étroite, Alavert, Taradeau, "Taradéou" en provençal - Oleaceae
Pistacia lentiscus - Pistachier lentisque - Anacardiaceae (odeur résineuse forte, feuilles persistantes, paripennées, baies rouges puis noires) Le lentisque est appelé poivre des garrigues
Pistacia terebinthus – Pistachier terebinthe – Anacardiaceae (odeur résineuse très prononcée - feuilles caduques, imparipennées, baies rouges puis brunes)
Tragopogon porrifolius -Salsifis a feuilles de poireau, du midi - Asteraceae
Trifolium stellatum - Trèfle étoilé - Fabaceae
Sisymbrium officinale - Sisymbre officinal - Brassicaceae (2 types de feuilles : inférieures pennatifides, supérieures hastées)
Galactites tomentosus ex G elegans – Galactites cotonneux, Chardon laiteux - Asteraceae
Smilax aspera – Salsepareille, Liseron épineux - Smilacaceae
Centranthus ruber – Centranthe rouge, Valériane rouge - Caprifoliaceae
Cistus albidus - Ciste blanc, cotonneux, à feuil blanches - Cistaceae (fleur rose, feuilles duveteuses)
Cytisus spinosus = Calycotome spinosa - Calycotome épineux – Fabaceae (cali calice cotome coupe > le calice se coupe) (médit. terrains siliceux, ne s'éloigne par trop du littoral).
Cistus monspeliensis - Ciste de Montpellier – Cistaceae (feuilles étroites, ptes fleurs blanches, visqueux)
Eucalyptus globulus – *Eucalyptus globuleux*, *Gommier bleu* – Myrtaceae (*arbre à feuilles très longues*)
Ruscus aculeatus - Fragon, petit houx, épine de rat, buis piquant, fragonnette, gringon, vergandier ou houx-frelon - Asparagaceae (feuilles = cladodes, rameaux courts et aplatis où se trouve la fleur et + tard le fruit : baie rouge) (jeunes pousses comestibles, crues ou cuites, baies toxiques)
Ferula communis - Férule commune – Apiaceae (latex toxique)
Asphodelus cerasiferus - Asphodèle cerise – Xanthorrhoeaceae (racine, tubéreuse, comestible)
Euphorbia cf cyparissias - Euphorbe petit cyprès – Euphorbiaceae (**regarder de + près**)
Lonicera implexa - chèvrefeuille entrelacé - Caprifoliaceae
Umbilic rupestris - Ombilic à fleurs pendantes, oreille d'abbé - Crassulaceae
Briza maxima – Grande brize - Poaceae
cf Herniaria - herniaire - Caryophyllaceae
Lavandula stoechas - Lavande stoechas, Lavande papillon - Lamiaceae
Sedum rupestre – Orpin des rochers – Crassulaceae
ou
Sedum ochroleucum = *Sedum anopetalum* – Orpin à pétales droits - Crassulaceae)
Myrtus communis - Myrte commun – Myrtaceae (feuill odorante)
Papaver rhoeas – Coquelicot - Papaveraceae
Euphorbe characias - Euphorbe characias – Euphorbiaceae
Polypodium vulgare – Polypode vulgaire - Polypodiaceae
Rhamnus alaternus - Nerprun alaterne – Rhamnaceae (drupe rouge puis noire toxique, mais teinture)
Spartium junceum – Spartier à tige de jonc, spartier, faux genêt d'Espagne, genêt d'Espagne, geneste, gineste, joncier, spartier faux jonc ou spartion - Fabaceae (filé et tissé pour en faire des draps, cordages au 18e et 19e siècles)
Linum usitatissimum subsp. angustifolium = *Linum angustifolium* = *Linum bienne* – Lin bisannuel - Linaceae
Allium roseum - Ail rose - Amaryllidaceae
Muscari comosum - Muscari à toupet, chevelu - Asparagaceae
Ruta angustifolia – Rue à feuilles étroites – Rutaceae (utilisation culinaire autrefois + médicale) (odeur forte)
Galactites tomentosus ex G elegans - Chardon laiteux - Asteraceae
Tyrimnus leucographus - chardon à tâches blanches – Asteraceae (petite fleur rosée ou purpurine – tâches blanches sur les feuilles)
Plantago afra – Plantain pucier, plantain psyllium, herbe aux puces, plantain brun, dit « de Provence », plantain psyllion – Plantaginaceae (utilisation médicinale)
Scandix pecten-veneris – Scandix peigne de vénus
Pistacia lentiscus - Pistachier lentisque - Anacardiaceae
Reseda phyteuma – Réséda raiponce – Resedaceae
Lagurus ovatus – Queue de lièvre, Gros minet – Poaceae

Tragopogon porrifolius -Salsifis a feuilles de poireau, du midi - Asteraceae
Galatella sedifolia =*Aster sedifolius* – Aster à feuilles de sedum – Asteraceae
Asparagus acutifolius – Asperge sauvage - Asparagaceae
Dorycnium pentaphyllum – Badasse, Dorycnie à 5 feuilles – Fabaceae (plante mellifère, feuilles aux folioles insérées sur un seul point.)
Silene gallica – Silène de France – Caryophyllaceae
Rosa canina – Rosier des chiens, des haies, Eglantier des chiens – Rosaceae (certains sépales sont bordés d'appendices allongés – 3 barbus, 2 rasés)
Vicia sativa – Vesce commune, cultivée, poisette – Fabaceae (étendard violacé avec ailes d'un pourpre brun)
Euphorbia helioscopia – Euphorbe réveil-matin ou Petite Éclaire – Euphorbiaceae (du grec *Helioscopia* "qui regarde le soleil", l'ombelle se déploie tôt le matin, face au soleil)
Lysimachia arvensis = *Anagallis arvensis* – Mouron des champs (rouge, parfois bleu)
ou *Lysimachia foemina* = *Anagallis foemina* – Mouron bleu – Primulaceae
Sherardia arvensis – Rubéole des champs, Shérardie Gratteron fleuri – Rubiaceae (fleur rose)
Daphne gnidium – Daphné garou, Thymèle, Saint-Bois – Thymelaeaceae (fleur blanche mars-oct)
Viburnum tinus – Laurier tin, Viorne tin, Laurentin, Fatamot – Adoxaceae (le fruit +- toxique)
3 espèces de Cupressus sp – Cyprès – Cupressaceae
-*Cupressus macrocarpa* – Cyprès de Lambert, de Monterey
-*Cupressus sempervirens* - Cyprès florentin
- et *Cupressus* ??
Pinus halepensis – Pin d'Halep – Pinaceae
Pinus pinea - pin parasol, pin pignon, pin d'Italie
Pinus pinaster – Pin maritime, pin des Landes, pin de Corse ou pin mésogéen
Crataegus cf azarolus = *Crataegus rusciniensis* - Azarolier, Azérolier ou Épine d'Espagne – Rosaceae (fleur après la feuille pour *Crataegus*, fleur avant la feuille pour *Prunellus*)
Cistus salviifolius – Ciste à feuilles de sauge – Cistaceae
Erica arborea – Bruyère arborescente, en arbre – Ericaceae
Carlina sp – Carline – Asteraceae
Misopates orontium – mufler des champs, mufler rubicond, Tête de mort – Plantaginaceae
Lobularia maritima = *Alyssum maritimum* – Alysson maritime, Lobulaire maritime - Brassicaceae
Pyrus sp – Poirier sauvage – Rosaceae (avec petits fruits)
Rosmarinus officinalis – Romarin – Lamiaceae
Silene vulgaris - Silène enflé, Silène commun, Claquet, Tapotte – Caryophyllaceae
Salvia verbenaca – Sauge fausse verveine – Lamiaceae
Quercus suber – Chêne-liège, Corcier, Surier, Suve – Fagaceae
Hordeum murinum - Orge des rats, Orge queue de rat – Poaceae
Linaria pelisseriana – Linaire de Pélissier - Plantaginaceae
Thymus vulgaris – Thym commun, Farigoule – Lamiaceae
Serapias cordigera – Sérapias en cœur – Orchidaceae (épichile du labelle très large en cœur, pourpre très foncé)
Malva subovata = *Lavatera maritima* – Lavatère maritime – Malvaceae (Protection nationale)
Tolpis barbata – Trépane barbue – Asteraceae
Linum strictum – Lin droit – Linaceae
Poa bulbosa var. vivipara - Paturin bulbeux vivipare
Anemone hortensis = *A stellata* – Anémone des fleuristes, des jardins – Ranunculaceae
Valeriana tuberosa – Valériane tubéreuse - Caprifoliaceae
Andryala integrifolia = *Andryala sinuata* – Andryale à feuille entières, Andryale sinueuse – Asteraceae
Erica arborea – Bruyère arborescente, en arbre – Ericaceae
Fraxinus ornus – Frêne à fleurs, Orne – Oleaceae
asteraceae jaune -
Bituminaria bituminosa – Trèfle bitumineux – Fabaceae
Plantago lanceolata – Herbe aux 5 coutures, Plantain lancéolé – Plantaginaceae
Foeniculum vulgare subsp. piperitum – Fenouil poivré – Apiaceae (odeur de fenouil)
Asparagus acutifolius – Asperge sauvage – Asparagaceae (pique – on mange les jeunes pousses)
Cytinus ruber – Cytinet rouge – Cytinaceae (parasite des cistes roses)
(le *Cytinus hypocistis* – Cytinet – Cytinaceae est parasite des cistes blancs)
~~*Carthamus lanatus* – Carthame laineux, faux safran – Asteraceae ou Scolumus~~
Isatis tinctoria – Pastel des teinturiers, Herbe de st Philippe – Brassicaceae (teinture bleue avec feuilles)
Ophrys scolopax – Ophrys bécasse – Orchidaceae
Hyoseris radiata – Hyoséride rayonnante – Asteraceae
Brachypodium retusum = *Brachypodium ramosum*- Herbe à mouton , brachypode rameux, bauque– Poaceae

Vinca major – Grande pervenche – Apocynaceae
Coronilla juncea – Coronille à tige de jonc – Fabaceae
feuilles d'Aster à feuilles de sedum
Selaginella denticulata – Sélaginelle denticulée – Selaginellaceae (toute petite fougère)
Asplenium adiantum-nigrum – Asplénium doradille-noire – Aspleniaceae
Feuilles d'Euphorbe characias (vivace)
Poterium sanguisorba = Sanguisorba minor – Pimprenelle - Rosaceae
Clinopodium nepeta = *Calamintha nepeta* – Petit calament – Lamiaceae
cf *Pulicaria odora* – Pulicaire odorante – Asteraceae (pas en fleurs)
Cynoglossum creticum – Cynoglosse de Crête – Boraginaceae
Limodorum abortivum – Limodore à feuilles avortées – Orchidaceae
Clathrus ruber, clathre rouge, cage grillagée - champignon – Phallaceae (rouge-corail puis orangé. Utilisé au Moyen Age par les sorciers et les jeteurs de sort)

Retour en bordure de route sur la falaise

Orobanche sp – Orobanchaceae
Glaucium flavum – Pavot cornu, Pavot jaune des sables, Glaucière jaune - Papaveraceae
Jacobaea maritima – Sénécon cinéraire ou Cinéraire maritime – Asteraceae
Misopates orontium - mufler des champs, mufler rubicond, tête-de-mort – Plantaginaceae
Plantago afra – Plantain pucier - Plantaginaceae